

NUESTRA FLORA MENOS CONOCIDA...

***Veronica fruticans subsp. cantabrica* M. Laínz**
(Verónica alpina)
Familia: *Scrophulariaceae*

Oscar García Cardo ogcardo@jccm.es

IRIAF – Instituto Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha

CARACTERÍSTICAS

Pequeña mata erguida de 1-3 dm, que dispone de tallos foliosos con pelosidad glandulífera dispersa en su parte apical; hojas oblanceolado-elípticas de 1-2 cm x 3-6 mm, glabras y algo lustrosas, de subsésiles a cortamente pecioladas. Inflorescencia en racimo terminal –a veces con algunos axilares–, compuesta por (2)4-10(18) flores, con cáliz de 4-6 mm y corola de 12-14 mm de un intenso y llamativo color azul, pedicelos florales y sépalos con abundantes pelos glandulíferos. Frutos en cápsulas glandulosas, más o menos ovaladas, más largas que anchas y con ápice agudo; semillas 0,9-1,5 x 0,4-1,2 mm de color pardo anaranjadas. Florece desde mayo hasta julio, dependiendo de las condiciones climáticas del año.

HÁBITAT

Se trata de una planta orófila, propia de alta montaña, que tiene preferencia por roquedos, repisas y gleras de naturaleza silíceas; aunque ocasionalmente, se puede observar formando parte de pastizales de montaña en sustratos someros y poco evolucionados.

DISTRIBUCIÓN

Planta ártico-alpina, que se extiende por el suroeste de Europa, donde es endémica de los Pirineos franceses y las montañas de la mitad septentrional de la península ibérica. En este último caso se extiende por los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, los Montes de León, el Sistema Ibérico septentrional y el Sistema Central, donde alcanza su límite de distribución meridional. En Castilla-La Mancha se conocen tan solo unas pocas poblaciones en la Sierra Norte de Guadalajara, concretamente, en el entorno del Pico del Lobo, la umbría del Pico Granero y sobre Cantalojas.



Distribución de *Stachys sylvatica* en la península ibérica (fuente: anthos.es).



Aspecto general de *Veronica fruticans subsp. cantabrica* en flor.

CONSERVACIÓN

Aunque no se incluyó originalmente en el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha del año 1998 (Decreto 33/1998), fue añadida al mismo en la revisión que se hizo en el año 2001 (Decreto 200/2001) en la categoría "Vulnerable". El número de poblaciones e individuos existentes en la región de Castilla-La Mancha –donde es finícola– es muy reducido, siendo su principal amenaza el cambio climático debido a sus requerimientos ecológicos; sin embargo, también puede verse afectada –atendiendo a la ubicación de las poblaciones– por pisoteo debido al uso turístico y recreativo.

Bibliografía:

- (1) ANTHOS (2025). *Anthos. Sistema de información sobre plantas de España*. Real Jardín Botánico (CSIC)-Fundación Biodiversidad. <http://www.anthos.es>.
- (2) CRUZ ROT, DE LA, M., F.J. REJOS BALLESTEROS, J. PAVÓN GARCÍA, J. ÁLVAREZ JIMÉNEZ y C. BARTOLOMÉ ESTEBAN (2001). *Estudio sobre la situación y problemática de conservación de las especies de flora y comunidades de vegetación de los pisos bioclimáticos oro y crioromediterráneos de la Sierra de Ayllón (Guadalajara)*. Ed. Departamento de Biología Vegetal. ETS Ingenieros Agrónomos, Univ. Politécnica de Madrid.
- (3) GARCÍA CARDO, O., J. GARCÍA MUÑOZ, C. MOLINA MARTÍN y G. MATEO SANZ (2024). *Adiciones a la flora de la provincia de Guadalajara*, VIII. Fl. Montib. 90: 82-103.
- (4) GBIF (The Global Biodiversity Information Facility). *GBIF Online Resource Centre. Labiatae*. <http://www.gbif.org/species/2927282> [accessed: Marz 2025].
- (5) MARTÍNEZ ORTEGA, M. M., J. Á. SÁNCHEZ AGUDO y E. RICO (2009). *Verónica L. In S. Castroviejo (coord.) Flora ibérica*: 13: 360-434. Real Jardín Botánico. CSIC. Madrid.